

ตัวอย่างยาที่ใช้ในการรักษาโรคลัมปี สกิน

กลุ่มยา	ชื่อยา	ความเข้มข้น	ขนาดการใช้ยา		ระยะเวลาการออกฤทธิ์	การใช้ยา	การบริหารยา
ยาด้าน อักเสบ ชนิด non-steroidal	Flunixin meglumine						
		50 mg/ml	2.2mg/kg	1 ml : 25 kg	30 ชั่วโมง	วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 วัน	Slow IV IM
	Tolfenamic acid						
		40mg/ml	2mg/kg	1ml : 20 kg	48 ชั่วโมง	วันละ 1 ครั้ง วันเว้นวัน	IV IM SC
	Phenylbutazone						
		236.1 mg/ml	4-8 mg/kg	1 ml : 25 kg	24 ชั่วโมง	วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 วัน	IV IM
ยา ปฏิชีวนะ	Ketoprofen						
		100mg/ml	3 mg/kg	1ml : 33 kg	24 ชั่วโมง	วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 วัน	IV IM
	Penicillin G						
		200,000 iu/ml	10,000-20,000 iu/kg	1 ml : 20 kg	48-72 ชั่วโมง	วันละ 1 ครั้ง 2-3 วัน/ครั้ง	IM SC
	Amoxicillin						
		150 mg/ml	15mg/kg	1 ml : 10 kg	48 ชั่วโมง	วันเว้นวัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง	IM SC
	Oxytetracycline						
		200 mg/ml	10mg/kg	1 ml : 20 kg	48 ชั่วโมง	วันเว้นวัน ติดต่อกัน 2-3 วัน	IM
	Gentamicin						
		40 mg/ml	2mg/kg	1 ml : 20 kg	24 ชั่วโมง	วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 วัน	IM
	Kanamycin						
		250 mg/ml	6-7.5 mg/kg	1 ml : 40 kg	24 ชั่วโมง	วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 วัน	IM

ตัวอย่างยาที่ใช้ในการรักษาโรคล้มปี่ สกน

กลุ่มยา	ชื่อยา	ความเข้มข้น	ขนาดการใช้ยา	ระยะเวลาการออกฤทธิ์	การใช้ยา	การบริหารยา
วิตามิน	AD3E					
			3-5 ml/ตัว		พิจารณาตามสุขภาพสัตว์	IM
	Biocatalin					
			20 ml/ตัว		พิจารณาตามสุขภาพสัตว์	IM
	Catasal					
			1 ml/10 Kg		พิจารณาตามสุขภาพสัตว์	IV IM SC
	Butaphos plus					
			1-2 ml/100 kg		พิจารณาตามสุขภาพสัตว์	IV IM SC
ยาใส่แผล	Vitadex-s					
			3-5 ml/ตัว		พิจารณาตามสุขภาพสัตว์	IM
	Povidone-Iodine		ใช้สำลีสะอาดชุบทาที่แผล			
						